

Quelle psychothérapie par quel thérapeute?

Cours de formation postgraduée et continue de l'Association Romande pour la Formation en Médecine Psychosomatique et Psychosociale

Jeudi 24 novembre 2005 à Posieux
(Fribourg)

9h – 12h:

- Introduction: Pr J. N. Despland (Psychiatre psychothérapeute), Dr J.-J. Pauchard (Généraliste psychosomaticien) et Dr H. Lambert (Psychiatre psychothérapeute)
- L'approche psychothérapeutique par le Médecin de premier recours: Dr L. Gamba (Interniste et allergologue psychosomaticien)
- Rôle du «psychiatre de liaison» en pratique privée: place de la supervision: Dr T. Niethammer (Psychiatre psychothérapeute)

12h: Assemblée générale de l'ARFMPP

13h: Dîner

14h30 – 17h15:

- 2 cas prétextes pour débattre du sujet en petits groupes suivi d'une table ronde avec les conférenciers du matin.
- «Autour d'une toux psychogène ...»: Dr E. De Rougemont Bucking (Psychiatre de liaison assistant), et Dr P. Cochand (Psychiatre psychothérapeute)
- «Le parcours du combattant entre le service des urgences et le cabinet du généraliste»: Dr D. Vuille (Interniste psychosomaticienne) et Dr G. Bondolfi (Psychiatre psychothérapeute)

Reconnaissance: SSMI: 5,5 heures, SSMG: 6 heures, AMPP: 5,5 EqH

Pour s'inscrire et obtenir le programme complet:

Dr Danièle Lefèvre


E-Mail: daniele.lefebvre@hin.ch

fax 022 755 24 54

Frais de participation:

Médecin 120 CHF,

Médecin assistant 80 CHF



SLEEP-DISORDERED BREATHING

These findings suggest that sleep-disordered breathing is pathophysiologically related to impaired glucose homeostasis, and that continuous positive airway pressure treatment can be an important therapeutic approach for diabetic patients with sleep-disordered breathing.

Babu AR, Herdegen J, Fogelfeld L, Shott S, Mazzone T. Type 2 diabetes, glycemic control, and continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea. *Arch Intern Med* 2005;165:447–52.

[Aus Journal Alerts – Global Family Doctor – www.globalfamilydoctor.com] / BK