Markus Gnädinger[1], Alessandro Ceschi[2], Joan Fuchs[2], Wolfgang Nentwig[3]

Offre d'étude «Morsures d'araignées en Suisse»

Notre petit groupe d'étude aimerait, en été et automne 2011, récolter les données sur les morsures d'araignées en Suisse. Tous les cabinets médicaux et les services d'urgence des hôpitaux seront priés de participer à l'étude.

Le plus souvent, ces morsures ont lieu dans les mois de juillet et août, surtout au crépuscule ou au début de la nuit. Ces morsures sont ressenties comme une piqûre de guêpe. Dans certains cas, on peut observer de petites perforations cutanées dues aux crochets de l'araignée. Parfois surviennent des nécroses cutanées. Il n'existe que des rapports de cas isolés de morsures en Europe centrale. Nous pensons toutefois que les morsures sont beaucoup plus fréquentes et nous aimerions lors de cette saison documenter si possible *tous les cas* qu'ils soient bénins ou plus chroniques pour autant qu'une consultation médicale ait eu lieu.
La figure 1 représente une chiracanthe ponctué *(Cheiracanthium punctorium).* En été, elle tisse dans les hautes herbes un cocon contenant ses œufs. Elle défend de manière agressive son cocon contre les animaux et les hommes. Elle est responsable de la plupart des morsures autochtones.

Figure 1
L'image représente une chiracanthe ponctué *(Cheiracanthium punctorium)* [3] dans son cocon.

Que pouvez-vous faire?
Participez à notre recueil de données. Conservez cet article et souvenez-vous de notre étude lorsque vous voyez un patient avec une morsure d'araignée. Annoncez les cas suspects ou certains et envoyez si possible l'araignée pour identification. Prenez une photo de la morsure. Visitez notre site Internet (www.spiderbites.ch). L'étude a été approuvée par la Commission d'éthique du canton de Zurich. Elle a été annoncée à ClinicalTrials.

Nous vous remercions de votre collaboration

Références
1 Vetter RS, Isbister GK. Medical aspects of spider bites. Annual Review of Entomology 2008;53:409–29.
2 Vetter RS, Isbister GK, Bush SP et al. Verified bites by yellow sac spiders (genus Cheiracanthium) in the United States and Australia: where is the necrosis? American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 74;2006: 1043–8 PMID 16760517.
3 http://de.wikipedia.org/wiki/Cheiracanthium punctorium.

1 Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich.
2 Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum, UniversitätsSpital Zürich.
3 Institut für Ökologie und Evolution, Universität Bern.

Correspondance:
Dr Markus Gnädinger
Birkenweg 8
9323 Steinach
markus.gnaedinger@hin.ch
www.spiderbites.ch