Chart für die Berechnung des absoluten Risikos in %, innerhalb von 10 Jahren ein tödliches atherosklerotisches Ereignis zu erleiden, und Zielwertempfehlungen für LDL-Cholesterin (LDL-C)

FRAUEN Name _____ Vorname _____ Datum _____



Schweregrade			Zielwertempfehlungen für LDL-Cholesterin (LDL-C)
1	niedrig–mässig	< 5 %	< 3 mmol/l. Im Einzelfall zu entscheiden
2	hoch	≥ 5 % < 10 %	< 2,6 mmol/l oder Reduktion um mindestens 50 % bei Ausgangs-LDL-C zwischen 2,6 und 5,2 mmol/l.
3	sehr hoch	≥ 10 %	< 1,8 mmol/l oder Reduktion um mindestens 50 % bei Ausgangs-LDL-C zwischen 1,8 und 3,5 mmol/l.

Projektteam Dres. med. Amato Giani, Stefan Schäfer – Beratender Kardiologe: Dr. med. Jost Schönberger

Stand September 2018

Chart für die Berechnung des absoluten Risikos in %, innerhalb von 10 Jahren ein tödliches atherosklerotisches Ereignis zu erleiden, und Zielwertempfehlungen für LDL-Cholesterin (LDL-C)

MÄNNER Name _____ Vorname _____ Datum _____



Schweregrade			Zielwertempfehlungen für LDL-Cholesterin (LDL-C)
1	niedrig–mässig	< 5 %	< 3 mmol/l. Im Einzelfall zu entscheiden
2	hoch	≥ 5 % < 10 %	< 2,6 mmol/l oder Reduktion um mindestens 50 % bei Ausgangs-LDL-C zwischen 2,6 und 5,2 mmol/l.
3	sehr hoch	≥ 10 %	< 1,8 mmol/l oder Reduktion um mindestens 50 % bei Ausgangs-LDL-C zwischen 1,8 und 3,5 mmol/l.

Projektteam Dres. med. Amato Giani, Stefan Schäfer – Beratender Kardiologe: Dr. med. Jost Schönberger

Stand September 2018