


# Dernière page

## Solution Périscope

Sans doute l'insuffisance coronarienne et l'infarctus du myocarde sont les plus fréquentes complications aiguës dans la consommation de la cocaïne. Cependant, cela n'est pas toujours le cas! Chez ce patient, le cliché du thorax avait montré un médiastin élargi et des hiles «congestionnés», et l'échocardiographie trans-thoracale un hémopéricarde, ainsi qu'une dissection de l'aorte ascendante. Juste à temps, car la pression systolique n'était plus qu'à 54

mm Hg à ce moment. Lors d'une thoracotomie d'urgence on avait implanté une bioprothèse dans l'aorte ascendante sans aucune autre complication. Compte tenu de la popularité de la cocaïne (25 millions d'Américains ont consommé de la cocaïne au moins une fois dans leur vie, et 1,5 millions sont des consommateurs habituels!) ce rappel de diagnostic différentiel constitue une information très utile. – *Nallamothu BK, et al. Of nocks and time. New Engl J Med 2001;345:359–63.*


[www.medicalforum.ch](http://www.medicalforum.ch)



online since January 2001

[www.emh.ch](http://www.emh.ch)

The medical portal of the Swiss Medical Publishers Ltd.



Vous trouverez ici des informations difficilement accessibles ailleurs:

- La banque de données la plus complète des adresses médicales
- L'agenda des congrès du BMS
- Accès à toutes les publications des EMH avec recherche par mot
- Les forums interactifs de EMH
- Recherche directe dans Medline
- Notre collection de liens
- shop EMH
- livres EMH